

衛生福利及食物局
嚴重急性呼吸系統綜合症簡報
(2003 年 5 月 28 日)

個案摘要

在 5 月 27 日，有多 9 名嚴重急性呼吸系統綜合症病人出院，令累積康復出院總人數達 1,285 人（佔 1,728 宗病例總數的 74.4%）。在 1,728 名嚴重急性呼吸系統綜合症患者中，381 人為醫護人員或醫科學生。目前仍有 174 名感染此病的病人留院，當中 69 名病人正在康復療養中，另外 32 名病人則在深切治療部接受治療。此外，有 12 宗懷疑個案正接受治療。

2. 在 5 月 27 日，共有多 2 名病人被證實感染嚴重急性呼吸系統綜合症。自 5 月 16 日起，新證實感染嚴重急性呼吸系統綜合症個案已經連續第 12 天維持在 5 宗以下。在過去一星期，每日被確認為新病例的個案平均數目僅為 1 宗。

3. 截至 5 月 27 日，共有 269 宗累積死亡個案，當中包括 5 名醫護人員（4 名醫院管員工及 1 名私人執業醫生）。61%的死者為男性，餘下的 39%則為女性。下表為按死者年齡組別和過往病歷的分布狀況。70%的死者先前已患有其他疾病，例如：高血壓、心臟病、糖尿病、中風等。65 歲或以上的長者則佔死亡案例總數的 63%。綜合這兩個因素，共有 78% 的死者先前已患有其他疾病，及/或是年屆 65 歲或以上。

年齡組別	已患有其他疾病?		總數
	是	否	
0 – 14 歲	0%	0%	0%
15 – 64 歲	16%	22%	37%
65 歲或以上	55%	8%	63%
總數	70%	30%	100%

註：由於進位關係，百分率相加未必等同總數。


4. 我們亦就 269 宗死亡案例由發病至死亡的相隔時間作出分析。如下表顯示，兩者相隔時間的幅度為 3 至 73 日，平均相隔時間是 23.5 日，而中位

數則是 21.0 日。男性及女性由發病至死亡的相隔時間差距很少。但年長組別（65 歲或以上）的有關相隔時間的平均數及中位數，都較年輕組別（15 – 64 歲）約少 9 日。我們亦發現本身已患有其他疾病的死亡病例組別，由發病至死亡的相隔時間，亦較沒有其他疾病的組別為短，而且平均數和中位數都約少 10 日。


組別	發病與死亡相隔時間（日）		
	幅度	平均數	中位數
男性	4 – 60	23.2	22.0
女性	3 – 73	23.9	21.0
15 – 64 歲	5 – 64	29.3	26.0
65 歲或以上	3 – 73	20.1	17.0
已患有其他疾病	3 – 58	20.7	18.0
沒有其他疾病	8 – 73	30.2	28.0
整體	3 – 73	23.5	21.0

5. 下列圖表一、圖表二和圖表三分別顯示，按性別、年齡和過往病歷分組，由發病至死亡的相隔時間的分布情況。


圖表一



圖表二



圖表三



瀝源邨榮瑞樓的最新情況

6. 截至 5 月 27 日止，衛生署接獲與沙田瀝源邨榮瑞樓有關的嚴重急性呼吸系統綜合症證實個案有 11 宗，懷疑個案有 1 宗。患者分別來自 5 個住戶。（最後一宗是在 5 月 25 日呈報的懷疑個案）。

7. 每當接獲懷疑出現個案群組後，政府的跨部門多專業小組便會迅速展開行動。在 5 月 7 日至 23 日期間，小組已在邨內進行多輪環境及流行病學調查，並在所有公用地方進行大規模的清洗及消毒工作。

8. 在 5 月 22 日抽取的環境樣本中，所有與污水系統及公用地方有關的環境樣本均沒有冠狀病毒的基因物，但我們卻在兩個與 4 樓最近呈報兩宗個案(一宗證實及一宗懷疑個案)的單位很接近的單位的地板、牆壁及窗戶的少數樣本中，發現有關的基因物。由於這些樣本是在 5 月 22 日及 23 日消毒工作進行前所收集的，衛生署現正進行消毒後的新一輪調查，並於 5 月 27 日在有關單位再次抽取樣本進行化驗。調查結果將於稍後公布。我們亦在調查該兩個單位的住客後，發現他們當中並沒有任何人出現嚴重急性呼吸系統綜合症的病徵。

9. 我們會繼續密切監察榮瑞樓的情況。衛生署亦已設立一個醫療站，為居民檢查體溫。此外，外展護士會每日探訪 4 樓的所有居民，了解他們的健康情況及提供其他所需的支援。

措施進展

在出入境檢查站實施健康檢查

10. 自 3 月 29 日起，機場、港口及各個出入境檢查站均設立了健康申報站，以觀察旅客是否出現嚴重急性呼吸系統綜合症的病徵。同時，所有入境旅客均須填寫健康申報表。當局由 4 月中起已在香港國際機場為所有入境、離境和過境旅客實施體溫測量措施。

11. 在其他的出入境管制站，所有經港口及陸路邊境通道抵港的人士，除申報健康狀況外，並已在 4 月 26 日起接受體溫檢查。由 5 月中起，在港澳碼頭和中港碼頭離境的旅客，以及乘搭直通車前往內地的人士須在進行測試體溫後，才可離開香港。此外，所有與嚴重急性呼吸系統綜合症患者有緊密接觸的人士在接受家居隔離期間，均不准離開香港。

12. 自從實施以上所有健康檢查措施後，截至 5 月 27 日，共有 2 名旅客證實患上嚴重急性呼吸系統綜合症。

家居隔離

13. 凡與已證實或懷疑患有嚴重急性呼吸系統綜合症病人有家居接觸者，均須在居所實行自我隔離，以接受最長為期 10 日的監察及治療。截至 5 月 27 日為止，共有 1,230 人（來自 482 個住戶）曾受這項規定影響，其中只有 29 人（來自 6 個住戶）仍須接受家居隔離。目前為止，當中 33 人證實感染嚴重性呼吸系統綜合症。

健康忠告／其他資料

佩戴口罩

14. 嚴重急性呼吸系統綜合症一般可在近距離透過飛沫傳播，直接接觸患者的分泌物也會受感染。預防呼吸系統疾病，最重要是保持良好的個人衛生，並培養良好的生活習以增強身體抵抗力。適當佩戴口罩可預防嚴重急性呼吸系統綜合症及其他呼吸道傳染病，亦是防止疾病傳播的方法之一。以下人士應戴口罩：

- 有呼吸道受感染症狀的人士。
- 照顧呼吸道有受感染症狀的病者的人士。
- 曾與嚴重急性呼吸系統綜合症患者或懷疑染病人士有過密切接觸的人士，由最後接觸之日起計算，最少十天連續戴上口罩。
- 進入醫院或診所的人士。
- 在醫院或診所工作的醫護人員。
- 處理食物的工作人員。
- 公共交通操作人員。
- 身處人多或空氣不流通的地方之人士。
- 在學校上課或工作的人士。在上體育課時、在空氣流通及寬敞的環境而學生沒有近距離面對面的動作等情況下除外。

15. 由於各種情況不能盡錄，一般市民宜根據以上指引，判斷是否需要

佩戴口罩。一般而言，任何人士認為有需要時，亦可佩戴口罩；並請緊記：-

- 常備口罩，以便有需要時佩戴。
- 佩戴口罩前，以及脫下口罩前後都必須洗手。
- 依照供應商的指示佩戴口罩。

16. 更多有關佩戴口罩的資料已上載於
<http://www.info.gov.hk/dh/diseases/ap/chi/facemask.htm>。

其他資料

12. 為協助市民對抗嚴重急性呼吸系統綜合症，衛生署已向不同界別發出預防此病的建議及指引。此外，當局已展開宣傳活動，向市民灌輸有關嚴重急性呼吸系統綜合症的各項知識，包括症狀、傳播途徑、盡早求醫的重要性及如何從個人及環境衛生入手採取各項預防措施。衛生署設有 24 小時錄音熱線電話（2833 0111）的查詢服務，提供健康教育資訊，有關資料亦已上載於衛生署的網頁（<http://www.info.gov.hk/dh>）。當局亦另設有一條熱線電話（187 2222），解答市民的查詢。

香港特別行政區政府
衛生福利及食物局