

衛生署 胸肺科

HP 衛生防護中心
Centre for Health Protection



接種卡介苗

胸肺科電話熱線：2572 6024

歡迎瀏覽網站：

http://www.info.gov.hk/tb_chest




衛生署

Department of Health

結核病

結核病是經由空氣傳染的疾病。雖然結核病在本港已逐漸受到控制，但它仍是香港常見的傳染病。



卡介苗疫苗有甚麼作用？

卡介苗疫苗能提高人體對結核菌的抵抗力，並有效地預防嚴重的結核病。



什麼人需要接受卡介苗防疫注射？

- 初生嬰兒
- 15歲以下從未接種卡介苗之兒童

如有以下健康問題，不宜接受卡介苗注射：

(1) 缺乏免疫能力，例如：

- 癌症病患者，尤其是白血病及淋巴毒瘤
- 接受放射治療，抗癌藥物治療及類固醇（俗稱『肥仔丸』）等抑制免疫系統的治療（服用類固醇的學童停藥後要三個月以上才能接受卡介苗注射，而接受過抗癌藥物治療的學童則要六個月以上）
- 患有先天或後天免疫能力缺乏症（後者又稱愛滋病）



(2) 在過往四星期內接受過麻疹、腮腺炎或德國麻疹（四星期過後便可接受卡介苗）

(3) 發燒

(4) 嚴重的皮膚病



如有以下任何一種情況，**不需**接受卡介苗注射：

- (1) 曾證實患有結核病
- (2) 曾接受過卡介苗注射
- (3) 年齡十五歲或以上




卡介苗防疫注射後的反應

注射卡介苗後二至四星期內，注射部位可能呈現小紅丘疹或潰瘍，此情況出現後，需待數星期才會逐漸退卻及完全痊癒，留下極輕微疤痕或甚至不留疤痕。間中有些兒童會出現腋窩下淋巴腺脹大的情況。其他不良反應，則極為罕見。

接受卡介苗注射後的護理：

1. 如有潰膿或小潰瘍情況出現，請勿驚惶，因這是正常現象。數星期後，上述情況便會逐漸退卻及完全痊癒。
2. 可照常沐浴。注射部位應保持清潔乾爽，需要時可用凍開水清潔並以紗布吸乾水份。
3. 在注射部位**切勿**塗任何藥物、藥水及藥膏等，**亦毋需**貼上膠布或敷上任何敷料，並**避免**緊身衣物。

如對上述反應有任何疑慮，請致電或前往就近的胸肺科診所查詢或檢查。後頁為全日開放的胸肺科診所地址、電話及卡介苗注射服務時間。



全日開放的診所

• 灣仔胸肺科診所 香港灣仔堅尼地道 99 號灣仔分科診所 1 樓	2591 1195
• 西營盤胸肺科診所 香港西營盤皇后大道西 134 號西營盤賽馬會分科診所 2 樓	2859 8227
• 筲箕灣胸肺科診所 香港筲箕灣柴灣道 8 號筲箕灣賽馬會診所 2 樓	2560 4522
• 九龍胸肺科診所 九龍旺角亞皆老街 147A 地下	2711 2086
• 油麻地胸肺科診所 九龍油麻地炮台街 145 號油麻地賽馬會分科診所 2 樓	2388 5939
• 石硤尾胸肺科診所 九龍石硤尾巴域街 2 號石硤尾健康院 1 樓	2777 4535
• 東九龍胸肺科診所 九龍鑽石山斧山道 160 號東九龍分科診所地下	2352 0077
• 容鳳書胸肺科診所 九龍茶果嶺道 79 號容鳳書紀念中心 1 樓	2727 8250
• 仁愛胸肺科診所 新界屯門屯利街 6 號仁愛分科診所 2 樓	2404 3740
• 南葵涌胸肺科診所 新界葵涌葵盛圍 310 號南葵涌賽馬會診所地下	2419 1721
• 圓洲角胸肺科診所 新界沙田插桅桿街 29 號圓洲角診所 1 樓	2647 6445
• 大埔胸肺科診所 新界大埔汀角路 37 號大埔賽馬會診所 1 樓	2689 5600

以上各胸肺科診所提供卡介苗注射服務時間為：

星期一至五 上午 9 時至下午 12 時 30 分

下午 2 時至下午 4 時 30 分

星期六、日及公眾假期休息