

結核病的診斷方法

如病徵疑似結核病，醫生往往會安排胸部X光及痰液檢查。

胸部X光檢查

胸部X光片雖可檢視因結核病而形成的異常陰影，但有時難以分辨陰影屬活躍肺結核、舊的疤痕，還是其他病變。因此，有需要安排痰液或其他檢查，以及跟進，來幫助診斷。




痰液化驗

痰液檢驗分兩部份，先利用顯微鏡檢查（痰涎塗檢），然後用培養基，培植痰液內可能存在的結核菌（痰涎培養）。

1. 痰涎塗檢

這是一個簡單而快速的測試。將痰液塗抹在玻璃片上，再利用特殊的染色技術，使結核桿菌在顯微鏡下顯示為抗酸桿菌（acid-fast bacilli）。如痰塗片為陽性，即是觀察到有抗酸桿菌的存在，病者可能患上肺結核病。反過來說，即使痰塗片屬陰性，仍未能完全排除結核病的可能性。



2. 痰培養測試

痰液培養測試雖有助於確診結核病，但其敏感度只有70%至80%。因為結核菌生長速度非常緩慢，痰培養測試需時。在尚未有測試結果前，醫生需要從臨床表徵、胸部X光和痰涎檢查等結果，作出臨床診斷，以適時決定是否有必要處方抗結核藥物。

其他檢驗

視乎情況，醫生可能會安排其他檢查以幫助診斷，例如，結核菌素皮膚測試、支氣管鏡檢查、活組織檢查、及電腦掃描等。

如有徵狀，請儘快就醫。