

接種卡介苗

胸肺服務電話專線：2572 6024

歡迎瀏覽網站：http://www.info.gov.hk/tb_chest

結核病

結核病是經由空氣傳染的疾病。雖然結核病在本港已逐漸受到控制，但它仍是香港常見的傳染病。

卡介苗疫苗有甚麼作用？

卡介苗疫苗能提高人體對結核菌的抵抗力，並有效地預防嚴重的結核病。

什麼人需要接受卡介苗防疫注射？

- 初生嬰兒
- 15歲以下從未接種卡介苗之兒童

如有以下健康問題，不宜接受卡介苗注射：

(1) 缺乏免疫能力，例如：

- 癌症病患者，尤其是白血病及淋巴毒瘤
- 接受放射治療，抗癌藥物治療及類固醇（俗稱『肥仔丸』）等抑制免疫系統的治療（服用類固醇的學童停藥後要三個月以上才能接受卡介苗注射，而接受過抗癌藥物治療的學童則要六個月以上）
- 患有先天或後天免疫能力缺乏症（後者又稱愛滋病）

(2) 在過往四星期內接種過活性疫苗，例如麻疹、腮腺炎或德國麻疹（四星期過後便可接種卡介苗）

(3) 發燒

(4) 嚴重的皮膚病

如有以下任何一種情況，不需接受卡介苗注射：

- (1) 曾證實患有結核病

- (2) 曾接受過卡介苗注射
- (3) 年齡十五歲或以上

卡介苗防疫注射後的反應

注射卡介苗後二至四星期內，注射部位可能呈現小紅丘疹或潰瘍，此情況出現後，需待數星期才會逐漸退卻及完全痊癒，留下極輕微疤痕或甚至不留疤痕。間中有些兒童會出現腋窩下淋巴腺脹大的情況。其他不良反應，則極為罕見。

接受卡介苗注射後的護理：

1. 如有灌膿或小潰瘍情況出現，請勿驚惶，因這是正常現象。數星期後，上述情況便會逐漸退卻及完全痊癒。
2. 可照常沐浴。注射部位應保持清潔乾爽，需要時可用凍開水清潔並以紗布吸乾水份。
3. 在注射部位切勿塗任何藥物、藥水及藥膏等，亦毋需貼上膠布或敷上任何敷料，並**避免**緊身衣物。

如對上述反應有任何疑慮，請致電或前往就近的胸肺科診所查詢或檢查。後頁為全日開放的胸肺科診所地址、電話及卡介苗注射服務時間。

全日開放的診所

• 灣仔胸肺科診所 香港灣仔堅尼地道99號灣仔分科診所1樓	2591 1195
• 西營盤胸肺科診所 香港西營盤皇后大道西134號西營盤賽馬會分科診所2樓	2859 8227
• 筲箕灣胸肺科診所 香港筲箕灣柴灣道8號筲箕灣賽馬會診所2樓	2560 4522
• 九龍胸肺科診所 九龍旺角亞皆老街147A地下	2711 2086
• 油麻地胸肺科診所 九龍油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診所2樓	2388 5939
• 石硤尾胸肺科診所 九龍石硤尾巴域街2號石硤尾健康院1樓	待重建中，暫停所有服務。 2777 4535
• 東九龍胸肺科診所 九龍鑽石山斧山道160號東九龍分科診所地下	2352 0077
• 容鳳書胸肺科診所 九龍茶果嶺道79號容鳳書紀念中心1樓	2727 8250
• 仁愛胸肺科診所 新界屯門屯利街6號仁愛分科診所2樓	2404 3740
• 南葵涌胸肺科診所 新界葵涌葵盛圍310號地下	2419 1721
• 圓洲角胸肺科診所 新界沙田插桅桿街29號圓洲角診所1樓	2647 6445
• 大埔胸肺科診所 新界大埔汀角路37號大埔賽馬會診所1樓	2689 5600

以上各胸肺科診所提供卡介苗注射服務時間為：

星期一至五 上午 9 時至下午 12 時 30 分

下午 2 時至下午 4 時 30 分

星期六、日及公眾假期休息

(rev. 1/2020)